

RECORD COPY

1/4

PCT REQUEST

#138

Original (for SUBMISSION) - printed on 18.10.2000 04:15:21 PM

0 0-1	For receiving Office use only International Application No.	RO/KR 00/01170
0-2	International Filing Date	18 October 2000 (18.10.00)
0-3	Name of receiving Office and "PCT International Application"	Korean Industrial Property Office International Application
0-4 0-4-1	Form - PCT/RO/101 PCT Request Prepared using	PCT-EASY Version 2.91 (updated 06.12.1999)
0-5	Petition The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty	
0-6	Receiving Office (specified by the applicant)	Korean Industrial Property Office (RO/KR)
0-7	Applicant's or agent's file reference	#138
I	Title of invention	PREPARING METHOD OF CHIRAL ESTER
II	Applicant	
II-1	This person is:	applicant only
II-2	Applicant for	all designated States except US
II-4	Name	Samsung Fine Chemicals Co., Ltd.
II-5	Address:	190, Yeocheon-dong Nam-ku 680-090 Ulsan Republic of Korea
II-6	State of nationality	KR
II-7	State of residence	KR
II-8	Telephone No.	82-2-772-1742
II-9	Facsimile No.	82-2-772-1749
III-1	Applicant and/or inventor	
III-1-1	This person is:	applicant only
III-1-2	Applicant for	all designated States except US
III-1-4	Name	Pohang University of Science and Technology
III-1-5	Address:	San 31, Hyoja-dong Nam-ku, Pohang-si 790-784 Kyongsangbuk-do Republic of Korea
III-1-6	State of nationality	KR
III-1-7	State of residence	KR

PCT REQUEST

#138

Original (for SUBMISSION) - printed on 18.10.2000 04:15:21 PM

III-2	Applicant and/or inventor	
III-2-1	This person is:	applicant and inventor
III-2-2	Applicant for	US only
III-2-4	Name (LAST, First)	PARK, Jai Wook
III-2-5	Address:	6-501, Professor Apt., 756 Jigok-dong, Nam-ku, Pohang-si 790-390 Kyongsangbuk-do Republic of Korea
III-2-6	State of nationality	KR
III-2-7	State of residence	KR
III-3	Applicant and/or inventor	
III-3-1	This person is:	applicant and inventor
III-3-2	Applicant for	US only
III-3-4	Name (LAST, First)	[KIM, Man-Joo]
III-3-5	Address:	6-1405, Professor Apt., 756 Jigok-dong, Nam-ku, Pohang-si 790-390 Kyongsangbuk-do Republic of Korea
III-3-6	State of nationality	KR
III-3-7	State of residence	KR
III-4	Applicant and/or inventor	
III-4-1	This person is:	applicant and inventor
III-4-2	Applicant for	US only
III-4-4	Name (LAST, First)	KOH, Jeong Hwan
III-4-5	Address:	12-213, Pohang University of Science and Technology Dormitory, 756 Jigok-dong, Nam-ku, Pohang-si 790-390 Kyongsangbuk-do Republic of Korea
III-4-6	State of nationality	KR
III-4-7	State of residence	KR
III-5	Applicant and/or inventor	
III-5-1	This person is:	applicant and inventor
III-5-2	Applicant for	US only
III-5-4	Name (LAST, First)	JUNG, Hyun Min
III-5-5	Address:	3-403, Graduate Apt., 756 Jigok-dong, Nam-ku, Pohang-si 790-390 Kyongsangbuk-do Republic of Korea
III-5-6	State of nationality	KR
III-5-7	State of residence	KR

See # 8

PCT REQUEST

#138


Original (for SUBMISSION) - printed on 18.10.2000 04:15:21 PM

IV-1	Agent or common representative; or address for correspondence The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:	agent
IV-1-1	Name (LAST, First)	HUH, Sang Hoon
IV-1-2	Address:	13th Fl. Hyecheon Bldg, 831, Yeoksam-dong Kangnam-ku 135-792 Seoul Republic of Korea 82-2-553-1331 82-2-557-1290 hallalaw@kornet.net
IV-1-3	Telephone No.	82-2-553-1331
IV-1-4	Facsimile No.	82-2-557-1290
IV-1-5	e-mail	hallalaw@kornet.net
V	Designation of States	
V-1	Regional Patent (other kinds of protection or treatment, if any, are specified between parentheses after the designation(s) concerned)	<p>AP: GH GM KE LS MW SD SL SZ TZ UG ZW and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT</p> <p>EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT</p> <p>EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE and any other State which is a Contracting State of the European Patent Convention and of the PCT</p> <p>OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GW ML MR NE SN TD TG and any other State which is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT</p>
V-2	National Patent (other kinds of protection or treatment, if any, are specified between parentheses after the designation(s) concerned)	<p>AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH&LI CN CR CU CZ DE DK DM DZ EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW</p>
V-5	Precautionary Designation Statement In addition to the designations made under items V-1, V-2 and V-3, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) of the State(s) indicated under item V-6 below. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit.	

PCT REQUEST

#138

Original (for SUBMISSION) - printed on 18.10.2000 04:15:21 PM

V-6	Exclusion(s) from precautionary designations	NONE	
VI-1	Priority claim of earlier national application		
VI-1-1	Filing date	18 October 1999 (18.10.1999)	
VI-1-2	Number	1999-45040	
VI-1-3	Country	KR	
VII-1	International Searching Authority Chosen	Korean Industrial Property Office (KIPO) (ISA/KR)	
VIII	Check list	number of sheets	electronic file(s) attached
VIII-1	Request	4	-
VIII-2	Description	16	-
VIII-3	Claims	6	-
VIII-4	Abstract	1	#138.txt
VIII-5	Drawings	0	-
VIII-7	TOTAL	27	
	Accompanying items	paper document(s) attached	electronic file(s) attached
VIII-8	Fee calculation sheet	✓	-
VIII-12	Priority document(s)	Item(s) VI-1	-
VIII-16	PCT-EASY diskette	-	diskette
VIII-18	Figure of the drawings which should accompany the abstract		
VIII-19	Language of filing of the international application	Korean	
IX-1	Signature of applicant or agent		
IX-1-1	Name (LAST, First)		

FOR RECEIVING OFFICE USE ONLY

10-1	Date of actual receipt of the purported international application	18 October 2000 (18.10.00)
10-2	Drawings:	
10-2-1	Received	
10-2-2	Not received	
10-3	Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application	
10-4	Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2)	
10-5	International Searching Authority	ISA/KR
10-6	Transmittal of search copy delayed until search fee is paid	

FOR INTERNATIONAL BUREAU USE ONLY

11-1	Date of receipt of the record copy by the International Bureau	14 NOV 2000	(14.11.00)
------	--	-------------	------------

키랄 에스테르의 제조방법 (Preparing method of chiral ester)


5 【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 키랄 에스테르의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하기로는 라세믹 알콜로부터 우수한 광학순도를 갖는 키랄 에스테르를 높은 수율로 얻는 방법에 관한 것이다.

최근, 금속 촉매와 효소 촉매를 이용한 비대칭 합성에 대한 연구가
10 활발하게 이루어지고 있다. 오늘날, 효소 촉매를 이용하여 라세믹 기질을 속도론적 광학 분할하는 방법은 유기 합성에서 기본적인 반응이 많이 이용되고 있다. 특히, 리파아제-촉매하에서의 에스테르의 가수분해 및 알콜의 아실화 반응에 관하여 다양하고 효율적인 방법들이 많이 알려진 상태이다.

15 속도론적 광학 분할 반응은, 일반적으로 라세믹 혼합물의 두 개의 에난소머(enantiomer)가 상이한 속도로 생성물로 변화되는 반응으로 정의된다. 그래서 효율적인 광학 분할 방법에서는 라세믹 혼합물의 에난소머중의 하나가 선택적으로 생성물로 변화되고 나머지 에난소머는 잔류하게 된다(반응식 1).

20 【반응식 1】




한편, 라세믹 알콜로부터 키랄 에스테르를 얻는 방법으로는, 에스테르 가수분해 효소를 이용한 속도론적 광학 분할(kinetic resolution) 방법이 널리 알려져 있다. 그런데, 이 방법에 따르면,
30 광학 순도가 높은 키랄 에스테르를 얻는 것은 가능하지만, 상기 반응식


1에서 알 수 있듯이 최대 합성수율이 50%로 제한되는 문제점이 있다.

이러한 문제점을 개선하기 위하여 알콜의 라세미화 반응과 병행하여 속도론적 광학 분할을 진행하는 동적 속도론적 광학 분할(dynamic kinetic resolution) 방법이 제안되었다(반응식 2).

5 【반응식 2】



이 동적 속도론적 광학 분할 방법중 변환효율이 가장 우수한 예는
15 하기 구조식의 루테늄 착물과 리파아제(Novozym 435)를 이용한 것이다(B. A. Persson, A. L. E. Larsson, M. L. Ray, and J. -E. Backvall, J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 1645).



25

이러한 동적 속도론적 광학 분할 방법에서는, 기질이 광학 분할 과정동안 연속적으로 이성질화되므로 출발물질의 이용효율이 매우 높아지게 된다. 따라서, (R) 또는 (S) 에난소머의 합성수율이 이론적으로 100%까지 가능해진다.

30 그런데, 이 방법을 실질적으로 적용해보면, 최종적으로 얻어진 키랄 에스테르의 광학순도는 99 e.e.%로 만족할 만한 수준이지만, 부산물인 케톤이 12-40% 정도 생성되는 문제점이 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

35 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 상기 문제점을 해결하여

라세믹 알콜을 동적 속도론적 광학 분할하는 경우, 케톤이 거의 생성되지 않으면서 광학 순도 특성이 우수한 키랄 에스테르를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.


5 【발명의 구성】

상기 기술적 과제를 이루기 위하여 본 발명에서는, 라세믹 알콜과, 상기 라세믹 알콜의 라세미화 반응을 촉진하는 금속착물, 종기로는 루테늄 착물, 더욱 바람직하기로는 화학식 1-3중에서 선택된 하나의 루테늄 착물과,

10 상기 라세믹 알콜의 하나의 에난소머를 선택적으로 아실화시키는 리파아제와,

상기 리파아제에 아실기를 공급하는 아실 도너를 혼합하여 반응시키는 것을 특징으로 하는 키랄 에스테르의 제조방법을 제공한다.


[화학식 1]



상기식중, Q는  또는  이고,

X는 Br, Cl 또는 I이고,

[화학식 2]




상기식중, Y₁, Y₂, Y₃, Y₄, Y₅, Y₆, Y₇, Y₈, Y₉, Y₁₀, Y₁₁, Y₁₂는 서로에 관계없이 단일결합을 나타내거나, 수소 또는 탄소수 1 내지 5의 알킬기를 나타내고,

X는 Br, Cl 또는 I이고,

[화학식 3]

5




상기식중, Y₁, Y₂, Y₃, Y₄, Y₅, Y₆, Y₇, Y₈, Y₉, Y₁₀, Y₁₁, Y₁₂는 서로에
관계없이 단일결합을 나타내거나, 수소 또는 탄소수 1 내지 5의 알킬기를
10 나타내고,

X는 Br, Cl 또는 I이다.


상기 루테늄 착물은 하기 화학식 5-12로 표시되는 화합물중에서
선택되는 것이 바람직하다.

【화학식 5】




20

【화학식 6】




【화학식 7】




35


【화학식 8】




【화학식 9】




【화학식 10】



【화학식 11】



25 【화학식 12】



상기식중, X는 Cl, Br 또는 I이다.


그리고 특히 상기 화학식 5-12에서, X는 Cl인 것이 가장 바람직하다.

35 상기 루테늄 착물의 함량은 라세믹 알콜을 기준으로 하여 0.1 내지 5몰%인 것이 바람직하다. 만약 루테늄 착물의 함량이 5몰%를 벗어나는 경우에는 제조비용이 높아지고 0.1몰% 미만인 경우에는 반응속도가 느려서 바람직하지 못하다.

 본 발명에 따라 라세믹 알콜을 동적 속도론적 광학 분할하여 키랄
40 에스테르를 제조하는 방법에 대하여 살펴보기로 한다.

먼저, 라세믹 알콜에 화학식 1-3의 루테늄 착물, 리파아제 및 아실기 도너를 혼합한 다음, 여기에 적절한 용매와 염기를 추가하여 반응시킨다.

5 【반응식 3】



15

상기식중, R_1 , R_2 및 R_3 는 서로 독립적으로 비치환된 또는 치환된 알킬기, 비치환된 또는 치환된 아릴기, 비치환된 또는 치환된 사이클로알킬기로 이루어진 군으로부터 선택되고, 경우에 따라서 R_1 과 R_2 , R_1 과 R_3 , R_2 와 R_3 는 서로 연결된 형태일 수 있다. 여기서 알킬기, 아릴기 및 사이클로알킬기에 치환가능한 작용기로는 할로젠 원소와 같은

20 헤테로 원자, 시안기(CN) 등이 가능하다.

상기 반응의 반응조건은 사용하는 루테늄 착물의 구조에 따라 달라진다. 화학식 6의 루테늄 착물($X=Cl$)을 사용하는 경우에는 반응 혼합물에 산소를 반드시 추가해야 하며, 반응 온도는 40 내지 60℃이고,

25 화학식 7의 루테늄 착물($X=Cl$)을 사용하는 경우에는 반응 온도는 20 내지 40℃이고, 화학식 10의 루테늄 착물($X=Cl$)을 사용하는 경우에는 반응 온도는 20 내지 40℃이다. 여기서 화학식 6의 루테늄 착물을 이용하는 경우는 산소(O_2)를 반드시 함께 사용해야 한다. 이 때 산소는 루테늄과 결합되어 있는 리간드인 포스핀과 반응하여 포스핀

30 옥사이드로 전환되어 제거된다. 그리고 반응도중 생성된 염산을 제거하기 위한 염기가 요구된다. 이 때 염기는 특별히 제한되지는 않으나, 구체적인 예로서, 트리에틸아민, 디이소프로필에틸 아민 등이

사용된다.

특히 화학식 7의 루테눔 착물은 상업적으로 손쉽게 입수가 가능하며, 알콜/아민 염기 조건하에서 화학식 10의 루테눔 착물로 전환되므로 실질적으로 화학식 7의 루테눔 착물을 사용한 경우와 화학식 10의 루테눔

5 착물을 사용했을 때 얻어지는 합성 결과는 거의 동일하다.


상기 화학식 1 내지 3의 루테눔 착물, 리파아제, 아실기 도너 및 라세믹 알콜의 반응 메카니즘을 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 아실 도너로부터 공급된 아실기가 리파아제와 결합되며, 이 리파아제가 라세믹 알콜의 하나의 에난소머를 선택적으로 아실화시켜
10 키랄 에스테르를 생성한다. 그리고 나머지 하나의 에난소머는 루테눔 착물의 촉매 작용에 의하여 라세미화 반응이 진행되게 된다. 이와 같은 라세미화 반응으로 얻어진 라세믹 알콜은 리파아제에 의하여 그중의 하나의 에난소머가 선택적으로 아실화되고, 이러한 과정이 반복되어 부산물인 케톤의 생성이 억제된 키랄 에스테르를 얻을 수 있게 된다.

15 본 발명의 용매는 특별히 한정되지는 않는다. 다만, 리파아제와 같은 효소 촉매 반응은 생성물의 합성수율 및 입체 선택성면에서 용매의 영향을 받는 것이 통상적이므로 메틸렌클로라이드, 톨루엔, 벤젠, 헥산을 사용하는 것이 바람직하다. 그리고 용매의 함량은 라세믹 알콜의 용액을 0.2 내지 0.3M 농도 범위내로 조절할 수
20 있는 정도를 사용한다.


상기 라세믹 알콜은 일반적으로 다음 화학식 4로 표시되며 그 화학구조가 특별히 제한되지는 않으나, 본 발명에서는 특히 화학식 4a-4f을 이용한다.

【화학식 4】




상기식에서 R_1 , R_2 는 상기 반응식 3에서 정의한 바와 같다.

【화학식 4a】




【화학식 4b】




15

【화학식 4c】




【화학식 4d】




30

【화학식 4e】



40

【화학식 4f】



상기 리파아제는 에스테르의 가수분해효소로서, 라세믹 알콜의 하나의 에난소머를 선택적으로 아실화하는 역할을 한다. 이러한 리파아제로는 슈도모나스 세파시아스 리파아제(*Pseudomonas cepacia*s lipase), 캔디다 안타크티카 리파아제 (*candida antarctica* lipase) 등이
 5 이용되며, 보다 구체적인 예로는 캔디다 안타크티카 콤포넌트 B 리파아제 서포티드 온 아크릴 레진(*candida antarctica* component B lipase supported on acrylic resin)(상품명: Novozym 435)(Novo사), 슈도모나스 세파시아스 리파아제 서포티드 온 세라믹 파티클(*Pseudomonas cepacia*s lipase supported on ceramic particle)(상품명: lipase PS-C)(Amano사)
 10 등이 있다. 그리고 리파아제의 함량은 노보자임의 경우에는 알콜 1mmol당 10 내지 60mg, 바람직하게는 30mg 정도이다. 그리고, 리파아제 PS-C인 경우에는 알콜 1mmol당 50 내지 320mg이고, 바람직하게는 160mg 정도를 사용한다.


상기 아실 도너는 리파아제에 아실기를 제공하여 리파아제
 15 촉매하의 아실 전이 반응에서의 평형을 아실화된 생성물쪽으로 이동시키는 역할을 한다. 이러한 아실 도너로는 아릴 에스테르 또는 알케닐 아세테이트가 바람직하며, 특히 전자수용성기(electron withdrawing group)를 갖고 있는 아릴 에스테르 예를 들어, p-클로로페닐 아세테이트가 가장 바람직하다. 그리고 알케닐 아세테이트의 예로는
 20 이소프로페닐 아세테이트가 있다. 이러한 화합물이 아실 도너로서 바람직한 이유는 적절한 반응성을 가지면서 라세미화반응을 방해하지 않기 때문이다. 그리고 아실 도너의 함량은 라세믹 알콜 1당량을 기준으로 하여 2 내지 4당량인 것이 바람직하다. 여기에서 아실 도너의 함량이 4당량을 초과하는 경우에는 반응후 분리하기가 어렵고, 2
 25 당량 미만인 경우에는 아실화 반응속도가 느려져서 바람직하지 못하다.

상술한 화학식 1 내지 3의 루테늄 착물, 리파아제, 아실기 도너 및 라세믹 알콜의 반응이 완결되면, 워크-업(work-up) 과정을 거쳐 키랄

에스테르를 얻을 수 있게 된다.

상기와 같이 본 발명에 따라 제조된 키랄 에스테르 화합물은 다음 화학식 100 과 같은 구조로 제조되는 것이다.

【화학식 100】




10

상기 화학식 100에서 R_1 , R_2 및 R_3 는 서로 독립적으로 비치환된 또는 치환된 알킬기, 비치환된 또는 치환된 아릴기, 비치환된 또는 치환된 사이클로알킬기로 이루어진 군으로부터 선택되고, 경우에 따라서 R_1 과 R_2 , R_1 과 R_3 , R_2 와 R_3 는 서로 연결된 형태일 수 있다.


15 이러한 본 발명에 따른 화학식 100의 키랄 에스테르는 통상적으로는 키랄 의약, 키랄 농약, 기타 키랄 신물질의 합성에 원료로서 이용될 수 있는 바, 구체적으로는 예를 들어 고지혈증 치료약으로 사용되는 화학식 101의 아토르바스타틴(Atorvastatin), 식품 또는 의약품의 기능성 첨가제로 사용되는 화학식 102의

20 L-카르니틴(L-Carnitine), 에이즈(AIDS)치료용 약제로 사용되는 화학식 103의 아제너라제(Agenerase) 등의 제조에 원료로 유용하게 사용될 수 있다.


【화학식 101】



【화학식 102】




【화학식 103】



상기한 용도의 화합물 중에서 예컨대, 최근에 아토르바스타틴(Atorvastatin)의 원료로서 고부가가치 제품으로 크게
20 각광을 받고 있는 화학식 101의 화합물의 경우는 본 발명에 따른 키랄 에스테르 중에서 다음 화학식 100a로 표시되는 키랄 화합물을 원료로 하여 예컨대 미국특허 제5,908,953호에 공지된 방법에 의해 제조할 수 있다.

【화학식 100a】



상기 식에서 R은 저급알킬기를 의미한다.

30 특히, 본 발명에 따라 제조되는 상기 화학식 100의 키랄 에스테르는 종래의 제법에 비해 케톤과 같은 부산물의 합성을 적어도 10%이하, 좋기로는 전혀 생성되지 않도록 최대한 억제하므로써 키랄아세테이트의 합성수율 약 98%까지 극대화시키면서도 그 광학 순도가 99%정도까지 우수하게 제조되는 것이므로, 무엇보다도 부산물을
35 최소화하여 제조 수율이 크게 향상되는 효과가 있으며, 위와 같은 고부가가치를 나타내는 의약품 등의 제조원료로 사용하는 경우 그

최종제품의 순도를 크게 향상시킬 수 있기 때문에 순도가 매우 중시되는 정밀화학 분야, 특히 식품, 의약품 제조분야에서 키랄 유도체를 제조하는 광범위한 화합물의 제조 원료로 바람직하게 사용될 수 있는 것이다.

이하, 본 발명을 하기 실시예를 들어 상세히 설명하기로 하되, 본 발명이 하기 실시예로만 한정되는 것은 아니다.

실시예 1

화학식 4a의 라세믹 알콜(0.25mmol), 트리에틸아민(0.75mmol), 화학식 6의 루테늄 착물($X=Cl$)(0.0130 mmol), 리파아제 PS-C 40mg 및
10 p-클로로페닐 아세테이트(0.75mmol)를 디클로로메탄 2.0ml에 혼합하여 적갈색 현탁액을 얻었다.

진공 조건하에서 상기 적갈색 현탁액으로부터 산소를 제거한 다음, 반응용기내를 아르곤으로 퍼지하였다. 그 후, 반응 혼합물에 산소(0.0130mmol)을 주사기로 부가하고 나서, 이를 60℃에서 43시간동안
15 가열하여 상응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

실시예 2-6

화학식 4a의 라세믹 알콜 대신 화학식 4b-4f의 라세믹 알콜을 각각 사용한 것을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법에 따라 실시하여
20 대응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

실시예 7

화학식 4a의 라세믹 알콜(0.25mmol), 트리에틸아민(0.25mmol), 화학식 7의 루테늄 착물($X=Cl$)(0.0100 mmol), 리파아제 PS-C 40mg 및
25 p-클로로페닐 아세테이트(0.75mmol)를 디클로로메탄 1.2ml에 혼합하여 검자주색 현탁액을 얻었다.

진공 조건하에서 상기 현탁액으로부터 산소를 제거한 다음,

반응용기내를 아르곤으로 퍼지하였다. 그 후, 반응 혼합물을 40℃에서 44시간동안 가열하여 상응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

실시예 8-12

- 5 화학식 4a의 라세믹 알콜 대신 화학식 4b-4f의 라세믹 알콜을 각각 사용한 것을 제외하고는, 실시예 7과 동일한 방법에 따라 실시하여 대응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

실시예 13

- 10 화학식 4a의 라세믹 알콜(0.25mmol), 트리에틸아민(0.25mmol), 화학식 10의 루테늄 착물(X=Cl)(0.0100 mmol), 리파아제 PS-C 40mg 및 p-클로로페닐 아세테이트(0.75mmol)를 디클로로메탄 1.2ml에 혼합하여 (검자주색) 현탁액을 얻었다.


- 진공 조건하에서 상기 현탁액으로부터 산소를 제거한 다음,
15 반응용기내를 아르곤으로 퍼지하였다. 그 후, 반응 혼합물을 40℃에서 44시간동안 가열하여 상응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

실시예 14-18

- 20 화학식 4a의 라세믹 알콜 대신 화학식 4b-4f의 라세믹 알콜을 각각 사용한 것을 제외하고는, 실시예 13과 동일한 방법에 따라 실시하여 대응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

비교예 1

- 25 화학식 4a의 라세믹 알콜(2mmol), 하기 구조식의 루테늄 착물(0.04 mmol), 노보자임 435(60mg) 및 p-클로로페닐 아세테이트(6mmol)를 톨루엔 5ml에 혼합한 다음, 아르곤 가스 분위기하에서 상기 반응 혼합물을 70℃에서 46시간동안 교반하여 상응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.



비교예 2-5

10 화학식 4a의 라세믹 알콜 대신 화학식 4b, 4d 및 4e의 라세믹 알콜 및 옥탄-2-올(octan-2-ol)을 각각 사용한 것을 제외하고는, 비교예 1과 동일한 방법에 따라 실시하여 대응하는 키랄 아세테이트를 제조하였다.

상기 실시예 1-18 및 비교예 1-5에 따라 실시한 결과, 키랄 아세테이트의 합성수율 및 광학순도와 부산물인 케톤의 합성수율을
 15 측정하여 하기 표 1에 나타내었다. 여기에서 알콜 및 키랄 아세테이트의 합성수율은 $^1\text{H-NMR}$ 를 이용하여 분석하였으며, 광학순도는 키랄 고속액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography: HPLC)를 이용하여 분석하였다. 분석에 사용된 $^1\text{H-NMR}$ 은 브루커 에이엠 300(Bruker AM 300)이고, HPLC는 스펙트라시스템(SpectraSystem)
 20 P2000이다.

【표 1】

구분	케톤의 합성수율(%)	키랄 아세테이트의 합성수율(%)	광학순도(e.e.%)
실시예 1	0	85	96
실시예 2	0	82	99
실시예 3	0	98	99
실시예 4	0	91	95
실시예 5	0	85	97
실시예 6	0	92	96
실시예 7	8	90	94
실시예 8	10	90	99
실시예 9	8	90	99
실시예 10	8	92	99
실시예 11	8	83	99
실시예 12	7	91	98
실시예 13	5	95	94
실시예 14	7	93	99
실시예 15	5	93	97
실시예 16	4	96	99
실시예 17	4	85	99
실시예 18	4	95	99
비교예 1	20	80 미만	-
비교예 2	40	60 미만	-
비교예 3	22	78 미만	-
비교예 4	23	77 미만	-
비교예 5	20	80 미만	-

상기 표 1에서 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 실시예 1-18에 따르면, 비교예 1-5의 경우와 비교하여 광학순도 특성은 거의 동등한 수준으로 나타났다. 그러나, 비교예 1-5의 경우에는 부산물인 케톤이 20~40% 정도 생성되는 반면, 실시예 1-18의 경우에는 케톤의 생성 수율이 10% 이하로 매우 현저하게 감소되어 키랄 에스테르의 합성수율이 매우 현저하게 개선되었다.

【발명의 효과】

본 발명의 화학식 1-3의 루테늄 착물과 리파아제를 이용한 촉매 시스템을 이용하면, 라세믹 알콜로부터 부산물인 케톤이 거의 생성되지 않으므로 제조수율이 크게 향상되고, 또한 우수한 광학순도를 갖는 키랄

5 에스테르를 제조할 수 있게 된다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

화학식 4의 라세믹 알콜과,

상기 라세믹 알콜의 라세미화 반응을 촉진하는 화학식 1-3중에서


5 선택된 하나의 루테늄 착물과,



상기 라세믹 알콜의 하나의 에난소머를 선택적으로 아실화시키는
리파아제와,

상기 리파아제에 아실기를 공급하는 아실 도너를 혼합하여
반응시켜 다음 화학식 100의 키랄 에스테르를 제조함을 특징으로 하는

10 키랄 에스테르의 제조방법.


[화학식 1]



상기식중, Q는  또는  이고,

X는 Br, Cl 또는 I이고,


20 [화학식 2]



상기식중, Y₁, Y₂, Y₃, Y₄, Y₅, Y₆, Y₇, Y₈, Y₉, Y₁₀, Y₁₁, Y₁₂는 서로에
관계없이 단일결합을 나타내거나, 수소 또는 탄소수 1 내지 5의 알킬기를
나타내고,

30 X는 Br, Cl 또는 I이고,


[화학식 3]



상기식중, $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6, Y_7, Y_8, Y_9, Y_{10}, Y_{11}, Y_{12}$ 는 서로에 관계없이 단일결합을 나타내거나, 수소 또는 탄소수 1 내지 5의 알킬기를 나타내고,


X 는 Br, Cl 또는 I이다.

5 [화학식 4]



10

[화학식 100]




상기 화학식 4 및 화학식 100에서 R_1, R_2 및 R_3 는 서로 독립적으로 비치환된 또는 치환된 알킬기, 비치환된 또는 치환된 아릴기, 비치환된 또는 치환된 사이클로알킬기로 이루어진 군으로부터 선택되고, 경우에 따라서는 R_1 과 R_2, R_1 과 R_3, R_2 와 R_3 는 서로 연결된 형태일 수 있다.


【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 라세믹 알콜이 다음 화학식 4a - 4f중에서 선택된 것임을 특징으로 하는 방법.


25 [화학식 4a]




[화학식 4b]




[화학식 4c]




[화학식 4d]



15 [화학식 4e]



[화학식 4f]




【청구항 3】

제 1 항에 있어서, 상기 리파아제가 슈도모나스 세파시아스
 30 리파아제(*Pseudomonas cepacia* lipase), 캔디다 안타크티카 리파아제
 (*candida antarctica* lipase)로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을
 특징으로 하는 방법.

【청구항 4】

35 제 1 항에 있어서, 상기 루테늄 착물이 하기 화학식 5-12로
 표시되는 화합물중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.


[화학식 5]




[화학식 6]



15 [화학식 7]




[화학식 8]




30


[화학식 9]




[화학식 10]



[화학식 11]



[화학식 12]



15

상기식중, X는 Br, Cl 또는 I이다.

【청구항 5】

제 4 항에 있어서, 상기 화학식 5-12의 화합물에서, X는 Cl인 것을
20 특징으로 하는 방법.

【청구항 6】

제 1 항에 있어서, 상기 루테늄 착물이 화학식 1의 화합물인 경우,
반응 혼합물에 산소가 부가되는 것을 특징으로 하는 방법.

25

【청구항 7】

제 1 항에 있어서, 상기 루테늄 착물 또는 그 유사체의 함량이
라세믹 알콜을 기준으로 하여 0.1 내지 5몰%인 것을 특징으로 하는 방법.

30 【청구항 8】

제 1 항에 있어서, 상기 아실 도너가 아릴 에스테르(aryl ester)인
것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 9】

제 8 항에 있어서, 상기 아릴 에스테르가 p-클로로페닐 아세테이트
및 알케닐 아세테이트로 이루어진 군으로부터 선택된 하나인 것을
특징으로 하는 방법.

5

10

15

20

25

【요약서】

【요약】

본 발명은 라세믹 알콜과, 상기 라세믹 알콜의 라세미화 반응을 촉진하는 루테늄 착물과, 상기 라세믹 알콜의 하나의 에난소머를
5 선택적으로 아실화시키는 리파아제와, 상기 리파아제에 아실기를 공급하는 아실 도너를 혼합하여 반응시키는 것을 특징으로 하는 키랄 에스테르의 제조방법을 제공한다.